

#### 東京大学 素粒子物理国際研究センター



### 山下研究室・研究紹介

- 国際リニアコライダー計画(ILC)
  田辺 友彦、倉田 正和、片山 領、家城 斉
- J-PARC中性子寿命・時空対称性の破れ 片山領、山田 崇人、家城 斉、長倉 直樹
- 先端加速器開発:ILC加速空洞&超伝導高周波電子顕微鏡 東直、藤倉 昇平
- 半導体光検出器PPDの開発 <sup>家城 斉</sup>
- 山下研の様子 〜修士 1 年の視点〜 加藤 悠
- 卒業生の軌跡 久保田隆至(LHC ATLAS)、森田裕一(J-PARC加速器)、 音野 瑛俊(PPD、中性子寿命)、生出秀行(PPD、RHIC実験)

ウェブ http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/yamashita/

Eメール satoru@icepp.s.u-tokyo.ac.jp

## ■ 世界最高を目指す挑戦

- ILC超伝導加速空洞
- J-PARC主加速空洞
- 超伝導高周波顕微鏡

- ILC測定器全体設計(ILD)
- 先端光量子センサー(PPD)

加速器 開発

測定器 開発



東京大学 素粒子物理国際研究センター やました さとる

山下 了 特任教授

#### 物理 研究

- LHC-ATLASミュオン・トリガーを用いた物理
- 中性子の寿命・時空対称性の破れ(J-PARC)
- RHIC-PHENIXでの陽子の内部構造


熱意のある方、詳しく知りたい方、訪問大歓迎です。 興味のある方は是非ご連絡ください!

EX->v satoru@icepp.s.u-tokyo.ac.jp http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/yamashita/

# ■ 国際リニアコライダー計画 LC

次世代を担うフロンティア加速器 **International Linear Collider (ILC)** 

電子陽電子衝突型線形加速器



重心系エネルギー 500 GeV~1 TeV 対消滅により全エネルギーを変換 新しい原理の解明を目指す

2028年頃の運転開始を目指し欧・米・アジアの 国際協力のもと、研究開発を進めている。

日本国内の建設を目指している。

http://www.linearcollider.org/ http://aaa-sentan.org/ILC/


LHCで発見された『新粒子・新現象』を ILCは精密測定で『新しい物理原理』と 『大統一理論』の解明を目指す



たなべ ともひこ 田辺 友彦 特任助教



倉田 正和 特任研究員




かたやま りょう 片山 領 博士5年




いえきせい 家城 斉 博士2年

## ILCの加速器と測定器




### ILD (International Large Detector)測定器



Hi!

- ・新しい原理をもちいた 高精細・高分解能測定器
- ・クォークのエネルギー 分解能を飛躍的に向上
- ・シリコンのバーテック ス検出器、ガスの飛跡検 出器(TPC)、細分化され た電磁およびハドロンカ ロリメータ等から成り、 それぞれの開発・性能評 価が進められている。



超電導加速空洞(約16,000台使用)

電磁カロリメータに用いる シンチレータ(約1000万本使用)




高精細かつ量産可能な検出器をつくるために シンチレータの形状の最適化を行う。

## ILCの物理解析

### 物理解析 ILCにおけるヒッグス粒子 や超対称性粒子の研究 ヒッグスがタウ粒子に 崩壊する事象 Events 009 008 SUSY + SM $\widetilde{\chi}_{1}^{+}\widetilde{\chi}_{1}^{-}$ 400 200 160 80 100 140 W Boson energy / GeV 超対称性粒子の質量を1%の精度で測定

### 再構成システムの開発


再構成システムのコア部分の研究開発 →解析精度の向上に貢献



### ILC研究の魅力

- ・大実験の立ち上げに関わる重要な仕事ができる (既に開始した実験では根幹部分に関わるのが難しい)
- 物理/測定器/加速器の多岐の分野から自分に合った研究テーマを選べる
- 国際会議で発表できる機会が多い

## 中性子寿命の精密測定



軽元素合成理論と中性子寿命

初期宇宙の元素構成を決定

WMAP, Planckなどによる 宇宙の物質密度の測定


標準理論を超える新物理の探索

中性子寿命(~10分)の精密測定

### 小林益川理論の検証

 $|V_{ud}|$ の精密測定

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}$$




### ■もうひとつのフロンティア: 超低エネルギー実験



スピン・フリップ・チョッパー(SFC)

多層膜ミラーと磁場で中性子ビームを切り出す →中性子が飛来する時間をより細かく特定でき るため、測定精度が向上する



原子核素粒子実験施設


タイム・プロジェクション・チェンバー(TPC)


中性子崩壊後の電子・中性子フラックスの同時測定を行う




- ・J-PARCに新設されたビームラインで実験
- ・2014年に物理実験を開始 →まもなく最初の結果を発表
- ・若手主体のチームで全システムを構築・研究 (現場はポスドクと学生がリーダー)名古屋大学・九州大学と連携
- ・その他の中性子基礎物理実験も多数計画

http://nop.kek.jp/





## 超冷中性子で探る時空の対称性の破れ



宇宙物質密度の精密測定 物質 >> 反物質




[2008年ノーベル物理学賞] が予言する標準理論の CP対称性の破れは 物質と反物質の 非対称性 を説明するには小さすぎる

ことが分かっている


未知のCP対称性の破れの起源があれば 例:超对标性粒子

### nEDM


の値を大きく変えうる!



## 中性子電気双極子モーメント精密測定




電場と磁場の向きを変え たときの超冷中性子の 歳差運動周波数の差から 電気双極子モーメントを 測定する



中性子電気双極子モーメント精密測定で 世界最高感度を目指して 未知の物理に迫る

### 量子効果により現れる 新しい物理の効果 未知の粒子の寄与 中性子内 クォーク χ $d_R$ 電気双極子 モーメントを 牛み出す光子 標準模型の寄与も量子効果で 現れる(=小さい)ため

新物理に対し高い感度を持つ



### ■ J-PARC中性子ビームをもちいたnEDM精密測定


J-PARCの中性子ビームを Doppler Shifterで減速→超冷中性子化する

#### 超冷中性子の特徴

- ・速度7 m s-1以下の遅い中性子
- ・容器に貯めることが可能
- ・重力に敏感(到達高さ~2.5 m)
- ・磁場に敏感(全反射~5T)
- ・貯蔵により精度の良い測定が可能





超冷中性子を貯蔵して歳差運動を測定












現在、中性子貯蔵容器の開発および nEDM測定のための準備実験が進行中

かたやま りょう 片山 領 博士5年


### | 先端加速器開発~ILC用超伝導加速空洞~

空洞内に電磁波を蓄え、電子を加速 未知のエネルギー領域に挑む

- 電場の波に電子をうまく乗せて大きな 加速勾配(35MV/m)を得る。
- 超伝導のため消費電力が小さい。



超電導加速空洞(約16,000台使用)



E Field[V\_per\_n

ILCで約16,000台並べる加速空洞の中心軸を 高精度で揃えるための手法を研究開発中。



#### **@KEK**

## ■**先端加速器開発**~超伝導伝導高周波加速電子顕微鏡~


加速器技術を転用し**世界最高電圧**を 持つ電子顕微鏡を実現させる研究



様々なメリット


- ・透過力の向上・高時間分解能の獲得
- ・世界最高位置分解能の達成 ・コンパクト化

現在KEKにて 原理実証実験が進行中






従来の電子顕微鏡



ILC技術の スピンオフ

#### 加速空洞モデル(断面)



# 世界初、2つのモードを同時に共振させる


エネルギー分散を抑え、 高位置分解能を得る

### 超伝導を採用

→ 2モードを同時にコントロー ルすることが可能になる

#### **@KEK**


## 一**先端加速器開発**~超伝導伝導高周波加速電子顕微鏡~



IPAC国際会議@上海にて

@いばらき中性子医療研究センター

# 先端加速器開発 ~BNCT用大強度陽子加速器~



## 半導体光検出器PPDの開発


#### **Pixelated Photon Detector**

半導体センサーでありながら、 光電子増倍管に匹敵する、新しいタイプの光検出器

- · 半導体光検出器
- •超小型,極薄
- ガイガーモードでの駆動
- ・1光子検出能力

- · 高検出効率 ~80%
- ・磁場に対する耐性
- ・低い動作電圧(~100V)

#### "フォトン・カウンティング"



#### 離散化した出力信号

#### 山下研·PPD開発研究班



音野 瑛俊

生出 秀行




家城 斉 博士2年


#### **PN-Diode**

Quenching Resistor (poly-Si)

Aluminium Wire (cathode)

#### 世界最先端の検出器







## 半導体基礎物理に立脚した光検出器開発

#### 1. 波形のモデル化とそれを応用した新PPDの製造


#### 2. ノイズの内部物理メカニズムからの理解



< Equivalent circuit of MPPC by Otono et al.>




Rq >> Rd




#### 3. 高増倍率・低ノイズを実現する 新構造の提案

4. TCAD3次元プロセス・デバイスシミュレータを もちいたPPD内部構造の解明研究




衝突電離過程のシミュレーション



次世代の素粒子実験を切り開く究極の光検出器の開発

#### 温度依存性



## ■ M1から見た山下研



#### Q M1は何をしていますか?

A. 前期は授業メインですが、自由な時間があるので好きな勉強ができます。また、MPPCという光検出器を使った実験やILCのシミュレーションもやっています。

#### ■ 普段の生活は?

授業の後に実験や解析、勉強をやって過ごしています。時には趣味の楽器を吹いて息抜き したりすることも。

#### ■ 山下研のいいところは?

メンバーの研究テーマが多彩なところです。 どの研究も興味深いものばかりで、実際にお 手伝いなどをしながら様々な知識を吸収する ことができます。


#### ■ ゼミはやっていますか?

他の研究室も含めたM1で素粒子物理の教科書を読むゼミをやっています。同期で気軽に質問や議論ができるのでとても有意義です。

### 卒業生の軌跡(1)~ATLASミュオン・トリガーを用いた物理~

世界最強の加速器
Large Hadron Collider (LHC)
14 TeVの重心系エネルギー
10<sup>34</sup> のルミノシティ

スイス・ジュネーヴのCERN研究所にて、 2009年11月より衝突実験開始




くぼた たかし **久保田 隆至** 卒業生(2011年博士) 現:メルボルン大学リサーチフェロー LHC ATLAS実験にに従事


## ■ ATLASミュオン・トリガー検出器

運動量分解能 ~ 1 / (検出器の大きさ)<sup>2</sup> -横幅ビル 1 5 階、高さビル8階に相当

### 25ナノ秒の時間分解能を持つ

-衝突の頻度を増やすことで効率的に実験ができる





### 卒業生の軌跡(2)~J-PARC加速空洞の開発~


Japan Proton Accelerator Research Complex @茨城県東海村 陽子ビームを加速して実験に利用する施設



3 GeV シンクロトロンに加速空洞が11台設置されている


J-PARCの三大問題のひとつを解決しました!
「磁性体コアの腐食・座屈問題」の原因を実験と数値計算をもちいて特定解決方法を提案し導入された

現在ビーム増強に向けて新しい加速空洞を開発中 http://j-parc.jp/Acc/ja/acc.html






## J-PARC加速空洞・試験機の設計・製作



### 卒業生の軌跡 (3) 偏極陽子衝突による陽子内部構造究明




RHIC加速器(米国ブルックヘヴン研究所)




#### 重イオン衝突実験

- ・クォークとグルーオンのプラズマの研究
- → ビッグバン直後の宇宙を再現 (LHC ALICE実験でも行われている)



### 世界最高エネルギーでの 『偏極』陽子衝突実験 ~陽子スピン起源の解明~



陽子を構成する3つのクォークだけでは陽子 スピンを説明することができないことが 実験的に分かっている






**不確定性原理**により湧いては消える グルーオンや,そのグルーオンから一瞬だけ 対生成するクォーク(**海クォーク**)が 陽子スピンの一部を担っていると考えられる → 陽子の構造を決める実験

## 偏極陽子衝突による陽子内部構造究明

「海クォークのスピンへの寄与はどのくらいあるか?」

※偏極:粒子の集団(ビーム)の中で 統計的にスピンの向きに偏りがあること




W崩壊からのミューオンを捉える

海クォークを見るためのプローブとして**W**粒子を使う (強い相互作用を見るために弱い相互作用を利用する)

→ 陽子偏極の向きを変えて実験を行うとW粒子の生成個数に 差が出る。これを測定することにより陽子の内部構造を探る。





#### PHENIX実験 @ RHIC加速器 (米国)

2009: 中心付近での W→ev イベントの測定

**2011**: **W**粒子測定のためのミューオン測定器のアップグレードを完了し、前後方向での**W** $\rightarrow$  $\mu$  $\nu$  $\gamma$ 

データ取得