ボトム湯川結合定数測定の可能性

Taiki YAMAMURA

ICEPP, the Univ. of Tokyo

Introduction

◆湯川結合・・・フェルミオン-ヒッグス間のcoupling

湯川結合の測定は、ヒッグス発見後、極めて重要になるstudy。

（湯川結合とfermion massの比例関係をチェックすることで、発見された粒子がSM higgsかどうかの議論を行うことができる。）

◆ ATLASでは、top(g_t), bottom(g_b), tau(g_τ) の結合定数が測定可能。

g_b の測定精度が出ない。

ttHを用いた測定・・・難しい。。

ttHによる測定を補う新たなモードとして、**VBF $H \rightarrow b\bar{b}$** を用いた g_b の測定可能性をstudyし始めた。

<湯川結合定数の測定精度>

VBF $H \rightarrow b\bar{b}\gamma$

$$pp \rightarrow Hyjj \rightarrow b\bar{b}\gamma jj + X$$

- Higgs生成過程に寄与するquarkやWボソンからの γ 放射を伴う事象。
(下のダイアグラム参照。)

- VBFプロセスの寄与がdominant。

- イベントセレクションにおいて、high- p_T の γ (例. $p_T > 20\text{GeV}$)を要求することで、シグナルのsensitivityを高められる。

Feynman diagram for VBF $H \rightarrow b\bar{b}\gamma$

MC simulation

$m_H=120\text{GeV}$ でのsimulationを試みた。

	process	Event generator	Cross section (pb)	Simulation
Signal	$\gamma H + N_{\text{jets}}$ with $H \rightarrow bb$ ($N \geq 2$)	Alpgen/Jimmy	$2.49e-02$	Full
BG	$bby + N_{\text{jets}}$ ($N \geq 2$)	Alpgen/Jimmy	185.9	Full
	$bb + N_{\text{jets}}$ ($N \geq 2$)	Alpgen/Jimmy	$8.19e+04$	Atlfast
	tt	MC@NLO	373.6	Full
	$\gamma + N_{\text{jets}}$ ($N \geq 3$)	Alpgen/Jimmy	$7.28e+03$	Atlfast

※1) **Signal のcross-section**

**$\text{Br}(H \rightarrow bb)=0.7$ を
仮定している。**

※2) **Atlfastでの設定**

- **Photon eff. : 80%**
- **Photon fake rate : $5e-04$**
- **b-tag eff. : 60%**
- **Fake-b rate : 1%**

Event selection

- ◆ # of photons ≥ 1
 - $P_t > 20\text{GeV}$, $|\eta| < 2.37$
(crack-regionは除く。
($1.37 < |\eta| < 1.52$))
- ◆ # of jets ≥ 4
 - $P_t > 20\text{GeV}$, $|\eta| < 4.7$
- ◆ 2 of b-tagged jets
- ◆ VBF selection
 - $\eta(j1) \cdot \eta(j2) < 0$
 - $|\Delta\eta(j1,j2)| > 2.0$
 - $M(j1,j2) > 800\text{GeV}$
- ◆ Central Jet Veto
 - $P_t > 20\text{GeV}$, $|\eta| < 3.2$
- ◆ $90 < M(bb) < 140\text{GeV}$

$|\Delta\eta(j1,j2)|$ 分布

$M(j1,j2)$ 分布

MC results

◆ # of selected events (Normalized at 30fb^{-1})

		Signal	Backgrounds			
			bby+Njets	bb+Njets	tt	γ +Njets
No selection		744	5.58e+06	2.46e+09	1.12e+07	2.18e+08
$N(\text{photon}) \geq 1$		356	2.17e+06	3.24e+06	2.33e+05	1.43e+08
$N(\text{jet}) \geq 4$		227	6.41e+05	9.57e+05	1.90e+05	4.48e+07
b-tag		100	2.90e+05	1.44e+05	6.86e+04	1.77e+04
VBF cut	$\eta(j_1) \cdot \eta(j_2) < 0$	89	1.67e+05	7.63e+05	4.68e+04	1.09e+04
	$\Delta\eta(j_1, j_2) > 2.0$	85	1.21e+05	5.98e+05	2.71e+04	7386
	$M(j_1, j_2) > 800\text{GeV}$	36	9058	5049	4284	518
Central Jet Veto		29	4824	1843	741	126
$100 < M(bb) < 140\text{GeV}$		25	1299	0	99	12

$$S/\sqrt{B} = 25/\sqrt{1410} = 0.68$$

M(bb)分布 (Normalized at 30fb⁻¹)

◆ Backgroundが非常に多い。
“bby+ Njets” がdominant。
(1410evts中の1299evts)

◆ シグナルとBGのkinematicsを詳しく理解したうえで、
sensitivityを高めるようなcutを今後考えていきたい。

- JetのPt cutのoptimization
- VBF cut (M(jj), $\Delta\eta(jj)$)
- Forward jet と b-jet間の Δr なども使えないか??

bby studyによる g_b の測定精度

極めてアバウトな議論をすると、、、

◆ $\mathcal{L} = 300\text{fb}^{-1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{シグナル事象数} : S=250 \\ \text{BG事象数} : B=14000 \quad (\text{sqrt}(B) \sim 118) \end{array} \right.$$

シグナル数の系統誤差 : $\delta S \sim 118$

Branching の測定精度 : $\delta Br/Br \sim \delta S/S = 47\%$

g_b の測定精度 : $\delta g_b/g_b = 0.5 * (\delta Br/Br) = 24\%$

M(bb)分布でのBG shapeの推定法について

**Photon selection以外のイベントセレクションで
control sampleを作れるのではと思っている。**

**“bb+jets”事象が大多数を占めるサンプル。
(MC result : $N \sim 10^5 - 10^6$ at 30fb^{-1})**

<推定してみた結果>

Black: Control sample

**Red: イベントセレクション後の
Total BG**

もう少し詳細なstudyが必要。。

Summary

VBF $H \rightarrow b\bar{b}\gamma$ を用いたボトム湯川結合定数(g_b)の測定可能性

◆ **high- P_t γ の生成を要求することで、 $H \rightarrow b\bar{b}$ 事象の sensitivityが高められる。**

◆ **MC result :**

$$S/\sqrt{B} = \mathbf{0.68} \quad (\text{at } \mathcal{L}=30\text{fb}^{-1})$$

$$(S = 25, B=1410)$$

◆ **g_b の測定精度 : 25% at 300fb^{-1} ??**

◆ **kinematicsをもう少しよく理解して、**

sensitivityを高めたい。

(BG shapeの理解も進める。)

bby以外のモードでの g_b 測定の可能性

High- p_T のヒッグス生成事象を用いたSubjet解析というのが proposeされている。 (arXiv:0810.0409)

◆ $p_T \geq 150-200\text{GeV}$ のヒッグス生成事象 ($H \rightarrow b\bar{b}$)

- ヒッグスから発生した2つのb-jetsが 1つのジェットに含まれてしまうような事象が多くなる。

Subjet解析を施すことで、シグナルをextract。

- 2つのsubjetがb-tagをpassするようなイベントをセレクト。
(2つのb-jetが同方向に運動しているイベントを選ぶことで、
Sensitivityが高くなる。)
- WH/ZH ($H \rightarrow b\bar{b}$) での解析が有望。
(High-Ptのレプトン等を要求することで、
さらにBGを抑えられる。)

磯部さんがWHモードでstudyを始めている。

➡ 詳しくは、午後のHiggs sub-WGで。

backup

Coupling-Mass Relation

<g(H,X)/g(H,W)の測定精度>
(X=t,b,τ,Z)

MC simulation

	process	total # of gen'd evts	Norm factor at 30fb-1	Simulation
Signal	$\gamma H + 2\text{jets}$	10000	8.20e-02	Full
	$\gamma H + 3\text{jets}$	10000	2.67e-02	
BG	$b\bar{b}\gamma + 2\text{jets}$	10000	373	Full
	$b\bar{b}\gamma + N\text{jets} (N \geq 3)$	10000	184	
	$b\bar{b} + 2\text{jets}$	$\sim 4.2e+06$	463	Atlfast
	$b\bar{b} + N\text{jets} (N \geq 2)$	$\sim 1.1e+06$	458	
	$t\bar{t}$ (lepton)	$\sim 2.5e+05$	25	Full
$t\bar{t}$ (all-had)	$\sim 9.7e+04$	52		
	$\gamma + 2\text{jets}$	5e+06	32	Atlfast
	$\gamma + N\text{jets} (N \geq 3)$	5e+06	12	